

Duratocin® - carbetocina – Solução Injetável: USO ADULTO. INDICAÇÕES:

Prevenção da hemorragia pós-parto devido à atonia uterina. **CONTRAINDICAÇÕES:** O uso inadequado da carbetocina durante a gravidez mimetiza sintomas observados após uso da ocitocina, incluindo hiperestimulação do útero, levando a contrações hipertônicas e/ou tetânicas, ruptura uterina, entre outras. A carbetocina não deve ser utilizada em pacientes com histórico de hipersensibilidade à ocitocina, carbetocina ou qualquer outro excipiente da fórmula. Não deve ser utilizada em pacientes com distúrbios cardiovasculares graves, doença renal, hepática ou com epilepsia. **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:** Duratocin® deve ser utilizado em unidades obstétricas bem equipadas e sob supervisão médica adequada. A administração deve ser feita utilizando uma única injeção de Duratocin®, por via intramuscular ou intravenosa, e não deve ser repetida. A carbetocina deve ser utilizada com cautela em casos de epilepsia, enxaqueca, asma e doenças cardiovasculares. Não foram realizados estudos específicos em mulheres grávidas com *diabetes mellitus*. Não há dados sobre o uso de carbetocina em pacientes com eclâmpsia. **Uso durante a gravidez e lactação:** Contraindicada durante a gravidez e/ou para a indução do parto. O uso desse medicamento não interfere no aleitamento do bebê. **Uso em idosos, crianças ou outros grupos de risco:** A indicação do produto não abrange sua utilização para pacientes idosas e crianças. **Interações medicamentosas:** Não é recomendada a associação da carbetocina com prostaglandinas e com alcalóides de ergot. A associação com halotano e o ciclopropano por via inalatória pode diminuir o efeito da carbetocina sobre o útero. **REAÇÕES ADVERSAS:** dor de cabeça, tremores, hipotensão, rubor, náusea, dor abdominal, coceira, sensação de calor. As reações adversas medicamentosas decorrentes do uso da carbetocina foram do mesmo tipo e frequência observados com ocitocina e placebo quando administrados após cesariana sob anestesia peridural ou raquidiana. **POSOLOGIA: Para cesariana eletiva realizada sob anestesia epidural ou raquidiana:** Administrar 1 mL do frasco-ampola contendo 100 mcg de carbetocina por injeção intravenosa de forma lenta durante 1 minuto. **Para parto vaginal:** Administrar 1 mL do frasco-ampola contendo 100 mcg de carbetocina por injeção intramuscular. **Modo de usar:** Administrar somente após o nascimento do bebê, o mais rápido possível após o parto, de preferência antes da remoção da placenta. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO / USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.** Para informações completas, consultar a bula do produto. Informações adicionais disponíveis aos profissionais de saúde mediante solicitação. Reg. MS: 1.2876.0024. L- Labelling-3785;v.1.0

CONTRAINDICAÇÕES: A carbetocina não deve ser administrada durante o período gestacional e não deve ser utilizada para a indução do trabalho de parto.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A associação da carbetocina a diversos analgésicos, espasmolíticos e agentes utilizados em anestesia epidural e raquidiana e não demonstrou qualquer interação medicamentosa.